

NOTE

SUR LES

ESPÈCES NOUVELLES D'OISEAUX

RECUÉILLIS

PAR M. L'ABBÉ ARMAND DAVID

DANS LES MONTAGNES DU THIBET CHINOIS

PAR M. J. VERREAUX

1. **PICUS DESMURSI.**

Supra pulchre niger : occipite coccineo; vitta superciliaris cervina; stria mystacali nigra; colli lateribus flavo-aurantiacis, rubro dilutis : remigibus rectricibusque externe albo-fasciatis. Subtus fulvus nigro stricte striatus. Rostro corneo; pedibus plumbeis; iride rubro fuscescente.

2. **PICOIDES FUNEBRIS.**

Omnino nigro fuliginosus; fronte albo variegato; vertice flavo ochraceo; stria post-ocularis nigra. Subtus albo sordidus : vitta dorsali alba; alis caudaque nigris, albo-fasciatis. Rostro corneo, pedibus nigrescentibus; iride brunneo.

3. SITTA SINENSIS.

Supra, cinereo cœrulescens; stria oculari transversa, super humeros recumbente. Subtus rufo-flavida, gula genisque rufo-albescentibus. Rostro cinereo, apice nigro; pedibus plumbeis; iride brunneo.

4. SIPHIA HODGSONII.

Supra cœruleo-ardesiacea; loris lateribusque capitis et colli nigrescentibus; tectricibus uropygialibus nigris; cauda basi alba, apice nigra; subtus flavo-aurantiaca, postice dilutior; rustro iridibusque nigris, pedibus fusce-brunneis.

5. PNOEPYGA TROGLODYTOIDES.

Capite colloque griseis, albido fuscoque fasciatis, collo laterali, scapulo, uropygioque rufescentibus, albo triangularis stigmatis; alis et cauda nigro rufoque striatis; rectricibus extimis albo variegatis, subtus rufa, albo maculata. Rostro pedibusque brunneis.

6. TURDUS AURITUS.

Supra brunneo-olivaceus; superciliis albido-rufis; genis nigro alboque variegatis, plumis singulis nigro lunulatis, guttere nigro albescente; pectore nigro maculis crebris obcordatis. Subtus albus; alis fasciis duobus transversis rufis; remigibus nigris, olivaceo marginatis. Rostro, iride pedibusque brunneis.

7. MERULA GOULDII.

Omnino rufo-castaneus; capite colloque umbrinis; alis caudaque nigris; crisso concolore, albo lunulato. Rostro et pedibus flavis; iride brunneo.

GENUS CHOLORNIS.

Paradoxornitheo simillimus : mandibula superiore minus sinuosa, magis apice truncata; digitus externus brevissimus; alæ breves; cauda elongata, graduata.

8. CHOLORNIS PARADOXA.

Brunneo olivacea; superciliis fusce nigrescentibus; oculis albo circumcinctis; remigibus nigrescentibus, cinereo olivaceo externe fimbriatis, interne flavidis. Rostro flavo; iride albido; pedibus brunneis.

9. SUTHORA ALPHONSIANA.

Capite, collo atque remigiis cinnamomeis, his fuscioribus; loris, colli thoracisque lateribus cinerascentibus; relique corporis rufescenti; abdomine albescente. Rostro albido; pedibus brunneis.

10. SUTHORA GULARIS.

Supra flavo-olivacea; superciliis albidis; gula, gutture et collo antico nigris; alis basi albis; caudaque rubro ochraceis. Rostro et pedibus castaneis.

11. ALCIPPE PECILOTIS.

Supra brunneo-rufus; superciliis lorisque albidis; alis et cauda rufis, subtus albus. Rostro pedibusque brunneis; iridibus rubris.

12. PTERORHINUS MAXIMUS.

Supra : rufa, plumis singulis nigro-terminatis, apice albo, alis nigris, primariis cinereo, secundariis rufo-marginatis, cauda basi cinereo olivascente, in medio nigra, apice albo late limbato. Subtus : rufo-cinnamomea; pectore nigro badiato. Rostro brunneo; mandibula flavescente; pedibus flavidis.

13. PTERORHINUS LANCEOLATUS.

Supra : intense rufus; superciliis albo brunneoque sparsis; stria mystacali super collum recumbente, nigrescente rufa. Subtus absolete brunneo albus; alis caudaque olivaceis. Rostro nigrescente; pedibus brunneis; iride flavido.

14. JANTHOCINCLA LUNULATA.

Supra : olivacea, albo-flavescente lunulata, capite colloque fuscoribus; remigiis nigris, primariis cinero pallide; secundariis albo flavidis; apice albis; rectricibus ad basin cinereis in medio nigris, apice albo limbatis. Subtus : rufula; pectore albo maculata; lateribus nigro fasciatis; rostro pedibusque dilute brunneis.

15. TROCHALOPTERON FORMOSUM, J. Verreaux.

Nouvelles Archives du Muséum, tome V, page 35.

16. TROCHALOPTERON ELLIOTII.

Cinereo olivascens; plumis capitidis, colli ac pectoris albo-argenteo apice partim ocellatis; remigiis nigris, in medio flavo-œneo maculatis, cœruleo

pallide marginatis; rectricibus supra flavo-aureis, apice albis; abdomine, cruribusque rufis. Rostro nigro; pedibus brunneis; iride flavo.

17. TROCHALOPTERON BLYTHII.

Capite nigro; fronte cinerascente; vitta mystacali alba; collo postice rufo; scapulo dilutiore, olivaceo flammato; uropygio castaneo; alis olivaceo auratis, primariis albido limbatis, macula basali nigra, altera cinerea notatis; cauda alis concolore. Subtus : rufescens. Rostro nigro; iride castaneo; pedibus brunneis.

18. ARUNDINAX DAVIDIANA.

Supra : rufescens, supercilio rufo-albido; subtus : cinerascents, plumis apice rufis; abdomine candido. Rostro et iride brunneis; pedibus pallidis.

19. ABRORNIS ACANTHIZOIDES.

Supra olivacea, rufo diluto; superciliis albo-flavescens; gutture colloque olivaceis. Subtus : flava. Rostro brunneo; pedibus albidis.

20. SIVA CINEREICEPS.

Capite cum collo postico cinereo margaritaceis; dorso rufo-violaceo; uropygio olivacente; rectricibus remigibusque fusce-brunneis, albide cinereo limbatis. Subtus argentata; lateribus cruribusque rufo-olivaceis. Rostro nigro; iride flavidus; pedibus brunneis.

21. SIVA RUFICAPILLA.

Capite colloque rufo-castaneis; dorso griseo, uropygioque rufo-olivaceis;

rectricibus et remigibus brunneis, rufo-olivaceo fimbriatis; subtus, albo-cinerascens fusco flammulata.

22. SIVA STRIATICOLLIS.

Supra : brunneo-ochracea; vitta super oculari concolore nigrescente. Subtus : cinereo-albida, brunneo-fusco ante collum flammulata; remigibus cinereo, nigro, olivaceoque marginatis. Rostro pedibusque brunneis; iride albo.

23. MINLA JERDONI.

Supra : brunneo-olivacea; capite nigro; stria alba per latera colli ducta; remigiis nigris, flavo, olivaceoque marginatis; primariis albo vittatis; rectricibus nigerrimis, rubro miniato fimbriatis. Subtus : flava; criso rosaceo; lateribus olivaceo flammulatis. Rostro nigro; iride flavido; pedibus plumbeis.

24. PROPARUS SWINHOII.

Supra : fuliginose olivaceus; capite nigro; vitta superciliari flava; remigiis nigris, primariis flavo-ochraceo, secundariis aurantiaco marginatis, apice albo maculatis; rectricibus concoloribus, aurantiaco limbatis. Subtus : aurantio-flavus; gutture et collo antico nigris. Rostro plumbeo; iride nigro; pedibus albidis.

25. YUHINA DIADEMATA, J. Verreaux.

Nouvelles Archives du Muséum, tome V, pag. 35.

26. PARUS PEKINENSIS, Arm. David.

Capite colloque nigerrimis; genis collo lateral ac postico albis; tergo cinereo-olivaceo; alis caudaque nigris, cinereo marginatis; fascia alarum

duplici albo punctulata. Subtus : flavo albidus. Rostro irideque nigris; pedibus plumbeis.

27. MECISTURA VINACEA.

Supra : fuliginosa-nigra; collo lateribus albis; fronte, genis, gutture, pectoreque vinaceis; abdomine vinaceo-albescente; rectricibus nigris, extimis apice albis. Rostro nigro; pedibus brunneo-rubescentibus.

28. MECISTURA FULIGINOSA.

Fuliginosa : supra rufescens; superciliis, facie, gutture, colloque antico cinereis; torque lato pectorali albo; abdomine fuliginoso; crrosso rosaceo albido; rostro pedibusque nigrescentibus; iride flavo.

29. CARPODACUS EDWARDSII.

Supra : vinaceo rufescens, brunneo flammulato; capite rubro vinaceo, argenteo micante; remigibus tectricibusque nigrescentibus; bis-speculo alari rosaceo. Subtus concolor; rostro, iridibus pedibusque brunneis.

30. CARPODACUS TRIFASCIATUS.

Supra : carmineus; facie argentato-roseo; uropygio dilutiore cinerascente; alis nigris; fascia alarum dupli rosea, altera alba; tectricibus minoribus nigris, apice carmineis; pectore, hypochondriisque rosaceis; abdomine candido; cauda nigra. Rostro iridibus, pedibusque brunneis.

31. CARPODACUS VINACEUS.

Supra vinaceus; subtus : dilutior; abdomine nigro striato; vitta per latera capitis ducta argenteo rosea; remigibus rectricibusque nigris, rubro-

vinaceo limbatis; alis fasciis 2 transversim albo rosaceis, tertia alba. Rostro pedibusque brunneis; iride rufo.

GENUS PYRGILAUDA.

Rostrum breve, basi depresso, apice conicum, mandibulis æqualibus, nares plumis basilibus opertæ. Tarsi, digitæ et ungues breves. Alæ elongatæ. Cauda mediocris emarginata.

32. PYRGILAUDA DAVIDIANA.

Supra isabellina; fascia guttureque nigris; genis albis; subtus alba; remigibus brunneis, externe albo-limbatis; cauda albo brunneoque variegata. Rostro pedibusque nigris; iride rubro.
